

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION BAS-VIVARAIS

ABONNEMENT ANNUEL: 110f

REGISSEUR RECETTES D.D.A.F.



RÉGION RHÔNE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CÉDEX 03

22 mai 1986

N° de série continue 122

Bulletin n° 12

VIGNE : LE CONCOURS MILDIOU EST OUVERT : RECHERCHEZ LES FOYERS PRIMAIRES

VIGNE

BLACK ROT : Protégez les foyers habituels

OIDIUM : Soignez la protection des cépages sensibles

Suite au temps orageux et à l'hygrométrie élevée, des symptômes en "drapeaux" se sont développés dans certaines vignes (ORGNAC, etc...).

MILDIOU : Premières contaminations probables suite aux pluies du 4 au 8 mai

Situation :

Ces pluies abondantes se sont déroulées avec des températures favorables au mildiou. Cependant, le débourrement de quelques cépages n'était pas suffisamment avancé pour la réceptivité à la maladie.

Les premières taches devraient apparaître maintenant :

- dans les situations les plus favorables au mildiou : bas fonds humides, mouillères.
- dans les parcelles ayant présenté des taches en mosaïques à la fin de l'année dernière.
- dans les vignes où les premières feuilles étalées étaient déjà visibles du 4 au 8 mai : cépages à débourrement précoce, régions précoces (ST MARCEL, ST JUST, LES VANS).
- plutôt sur les feuilles les plus proches du sol (repousses de base du cep).

CONCOURS MILDIOU : SOYEZ NOMBREUX A Y PARTICIPER

Les personnes qui nous signaleront les TROIS PREMIERS FOYERS de communes différentes bénéficieront d'un abonnement gratuit de 1 an à la revue PHYTOMA Défense des Cultures. En effet, c'est à partir de ces foyers qu'elle va se propager d'abord dans la parcelle puis dans la petite région.

LA CONNAISSANCE DES FOYERS PRIMAIRES PERMET DE DONNER LES DATES OPTIMALES DE TRAITEMENT

En cas de découverte de taches :

- téléphonez à la Protection des Végétaux poste de VALENCE (75.42.77.68),
- enveloppez les feuilles tachées entre 2 feuilles de papier journal ou dans du coton hydrophylle et glissez le tout dans un sac plastique,
- envoyez ce sac dans un colis affranchi à :

Service de la Protection des Végétaux
33 avenue de Romans - BP 916 -
26009 VALENCE CEDEX

..... coupon à détacher et à retourner complété avec votre échantillon.....

Nom, prénom	Age de la vigne
Adresse	Cépage
.....	Rang de la feuille sur le rameau en par-
Téléphone.....	tant de la base (1er, 2e, etc.)
Lieu de découverte de la tache de	Situation du vignoble (côteau, plaine,
mildiou (commune, quartier).....	cuvette, etc.).....
.....
Date	Importance de l'attaque

ARBRES FRUITIERS

CERISIER

PROTECTION FONGICIDE AVANT RECOLTE : Indispensable sur toute variété

Le temps chaud et orageux favorise le développement du Monilia.

Produit conseillé : bénomyl à 30 g ma/hl (BENLATE), également efficace contre l'antracnose. Pour limiter les risques de résidus sur fruit, n'intervenez pas à moins de 4 ou 5 jours de la cueillette, traitez avant.

PECHER

TORDEUSE ORIENTALE : Sur les arbres en production, intervenez entre le 24 et le 28 mai

Il s'agit de diminuer les populations du ravageur pour faciliter la suite de la lutte. En verger en formation, le traitement préconisé dans notre dernier bulletin sera renouvelé au bout de 10 jours.

Produits conseillés : fenitrothion à 50 g ma/hl (nb. spéc.) ou phosalone à 60 g ma/hl (AZOPHENE, ZOLONE).

COCHENILLE DU MURIER : Les larves mobiles sortent

En présence de ce ravageur, on interviendra en milieu de semaine prochaine avec méthidation à 60 g ma/hl (ULTRACIDE BOUILLIE), utilisé seul et sans mélange, également efficace contre la Tordeuse Orientale.

Rappelons que le traitement d'hiver reste la base de la lutte.

PRUNIER

CARPOCAPSE DES PRUNES : En région précoce et moyenne 1^{er} traitement à la fin de la semaine prochaine

En région tardive (MEYRAS), attendez un prochain bulletin.

Produits utilisables : azinphos à 40 g ma/hl, deltaméthrine à 0,75 g ma/hl (DECIS), perméthrine à 4 g ma/hl (AMBUSH), phosalone à 60 g ma/hl (AZOPHENE, ZOLONE), phosalone permet le mieux de préserver les insectes utiles.

ROUILLE : Ajoutez un fongicide efficace en verger sensible

POIRIER - POMMIER

TAVELURES : Des taches sont apparues et d'autres vont sortir

La protection doit être soignée.

CARPOCAPSE : 1^{er} traitement pour les utilisateurs de DIMILIN

- Dès réception en région précoce (VALLEE DU CHASSEZAC, ST JUST)
- Entre le 27 et le 29 mai région moyenne (ST SERNIN, GROSPIERRES, LUSSAS)

Rappelons l'intérêt particulier du DIMILIN dans le cadre d'une lutte raisonnée contre le psylle du fait de son innocuité sur les prédateurs. Par contre, il n'est pas efficace contre les Pucerons et ne doit pas être utilisé dans les vergers où la prochaine récolte est destinée à l'export vers l'Amérique du Nord.

Autres régions, autres produits : attendez encore.

POIRIER

PSYLLES : Les éclosions de 2^{ème} génération débutent mais attendez encore

P. 3 : Notre fiche couleur : les prédateurs du psylle : reconnaissez les : il faudra les préserver.

POMMIER

OIDIUM : Temps orageux. Soignez la protection